

Le SEMIS d'ACACIA

Allier Reboisement ET Couvert à Gibier

De croissance rapide, l'acacia ou robinier offre de nombreux débouchés (biomasse, piquets, bois d'œuvre...). Il forme également des boisements propices à l'accueil du gibier. Le semis direct est une technique de reboisement très économique et facile à mettre en œuvre.



Les avantages de l'acacia:

- Croissance **rapide**
- **Espèce pionnière**, tolérant des sols pauvres
- **Capacité à fixer l'azote de l'air**
- Pousse sur **tout terrain** sauf argileux ou humide
- Floraison **très mellifère**



Le semis :

- **Calendrier :**
 - ✓ Au printemps, sur sol chaud (entre le 15 Avril et le 15 Juin)
- **Préparation des graines :**
 - ✓ Aucune : le tégument a été scarifié et les semences sont prêtes à germer
- **Préparation du sol :**
 - ✓ Sur ancien terrain forestier, griffez grossièrement le sol (covercrop, herse, ...).
 - ✓ Après une culture, labourez, puis hersez pour préparer le lit de semences aussi fin que possible.
 - ✓ Après une prairie, appliquez un herbicide avant de labourer (**plus d'info au dos**).
- **Semis :**
 - ✓ Semez en plein, en bande ou en lignes distantes de 0,7 à 1m pour obtenir des arbres bien droits
 - ✓ A la volée ou au semoir agricole (plateau colza)
 - ✓ A la densité de **5 kg/ha**
 - ✓ Recouvrir avec une herse légère ou un rouleau sur sol agricole, ou en trainant un jeune bouleau sur sol forestier
- **Protection contre les ravageurs :**
 - ✓ Traitez contre les limaces. Les jeunes semis sont très appétents pour les gastéropodes !

Le SEMIS d'ACACIA

Allier Reboisement ET Couvert à Gibier



Gestion du désherbage :

Si vous aménagez une ancienne prairie, il faut prévoir une préparation du sol sérieuse en amont du semis.

- Avant semis :
 - ✓ Appliquez un herbicide, type glyphosate. Laissez agir 3 semaines au moins.
 - ✓ Réalisez un labour profond à plat pour ramener en surface un horizon pauvre en graines de mauvaises herbes.
 - ✓ Effectuez plusieurs faux-semis : hersez pour préparer le lit de semences, laissez lever les mauvaises herbes, puis passer un outil en surface pour les éliminer.
- Au cours du 1^{er} printemps/été :
 - ✓ Contre les chardons : il est possible d'intervenir avec du Clopyralid localement.
 - ✓ Contre les graminées : avant montaison, il est possible d'appliquer des produits à base de Quizalofop-P-éthyl ou de Fluazifop-P-butyl.



POUR NOUS CONTACTER

VILMORIN Semences d'Arbres
 Route du manoir - 49250 La Ménitré
 Tél : 02.41.79.41.66 - Fax : 02.41.79.75.41
semences.arbres@vilmorin.com